



SLNEČNICA



Platia rovnaké zásady ako pri repke olejnej.

● Skoré fázy:

Optimálny termín: pri dostatku listovej plochy

1. **ENVISTART** 1,0-1,5 l / ha odporúčame aplikovať predovšetkým do poškodených porastov
Dôvod: ENVISTART použite najmä v prípadoch poškodenia - sucho, ľadovec. Listy slnečnice majú aj po ťažkom poškodení vysokú regeneračnú schopnosť. Vyhnite sa spoločnej aplikácii s herbicídmi za vlhka predovšetkým v skorých fázach a pri vysokom výskyte burín. Vysoký stimulačný účinok môže blokovať účinok herbicídu.

2. **ENVIFYT Superkoncentrat** 3,0-4,0 l / ha univerzálne hnojivo s humínovými kyselinami a dôrazom na podiel prijateľného NPK, vyšší podiel stimulačnej zložky, nízka dávka na ha. Najlepšie do 6. listu.
Dôvod: slnečnica priaznivo reaguje na prítomnosť humínových látok prijateľného P+K vo všetkých rastových fázach.

● Neskoršie fázy:

Optimálny termín: aplikácií do začiatku kvitnutia

Možnosti:

1. **BORIS P+K** 1,0-3,0 l / ha špecialista pre neskoré aplikácie do náročných technických plodín. Vysoký podiel B, P, K, listom prijateľnej S, Mo, mikroprvkov a stimulácie. Priorita je stimulovať tvorbu kvetu, a zabezpečiť živiny pre ich optimálny vývoj semien.

Dôvod: nič lepšie do olejní nemáme, za podmienky, že nemusíme riešiť iné problémy - ako nedostupný dusík, extrémne sucho, poškodenie škodcami.

2. **ENVIFYT Superkoncentrat** 3,0-4,0 l / ha univerzálne hnojivo s humínovými kyselinami a dôrazom na podiel prijateľného N+P+K, vyšší podiel stimulačnej zložky, nízka dávka na ha.

Dôvod: nízky príjem živín z pôdy (sucho, nízka hodnota živín v pôde hlavne dusíka), potreba dosiahnuť špičkové kvantitatívne parametre a kvalitu. Spoločný účinok v širokom spektre podmienok.

EKONOMIKA POUŽITIA: technológia pestovania olejní je náročná na udržanie porastu kontinuálne vo vysokej kondícii. Kombinácia VÝŽIVA + MIKROPRVKY + STIMULÁCIA pri výžive cez listy je nenahraditeľná.

