



VINIČ



● Skoré fázy

ENVISTART 0,8-1,5 l/ha odporúčame aplikovať 1-2 krát.

Dôvod: zabezpečenie mikroprvkami a stabilizácia rastu po zime. Dosiachnutie zeleného efektu a zlepšenie zdravotného stavu listov. Zlepšenie čerpania živín koreňmi.

Používanie **ENVISTART-u** v neskorých fázach môže predĺžiť dobu dozrievania o cca 14 dní.

- **Neskoršie fázy:** príprava kvalitatívnych (optimálna zrelosť, metabolizácia voľného dusíka, cukrnatosť) a objemových parametrov, možno kombinovať s pesticídmi
Optimálny termín aplikácií: podľa potreby a vývoja porastu.

Možnosti:

1. **BORIS P+K** 1,0-3,0 l/ha špecialista pre neskoré aplikácie do viniča. Vysoký podiel B, P, K, listom prijateľnej S, Mo, mikroprvkov a stimulácie. Prítomnosť prijateľnej S je dôležitá pre zdravotný stav porastu. Skúsenosti s prijateľnou formou P+K vo vyšších koncentráciách sú veľmi priaznivé hlavne v období tvorby cukrov (zaznamenali sme úspech pri predchádzaní „kamenenia“ bobúľ na parcelách kde sa tento problém pravidelne opakuje).

Dôvod: vysoká náročnosť viniča na bór, draslík, síru, molybdén, mangán počas tvorby cukrov v neskorších fázach vysoko favorizuje **BORIS P+K**. Pri jeho použití nedochádza k predĺžovaniu doby dozrievania ako u prípravkov ktoré obsahujú humínové kyseliny a dusík.

Ovocné dreviny: odporúčame použiť v skorých fázach **ENVIFYT profi** a v neskorších fázach **BORIS P+K**.

